

Szczepienie przeciw COVID-19 dla uczniów klas 7–10.

W sierpniu przed dziećmi w wieku od 12 do 15 lat otwiera się możliwość przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Opiekun proszący o podanie swojemu dziecku szczepionki musi mu towarzyszyć podczas szczepienia lub wyznaczyć inną, zastępującą go osobę w wieku co najmniej 18 lat, która powinna okazać upoważnienie. Dzieci z klasy 7., które skończą 12 lat po 1 września, będą mogły przyjąć szczepionkę tej jesieni w późniejszym terminie.

W regionie stołecznym szczepienia odbywają się w Laugardalshöll, opiekunowie zostaną poproszeni o przywiezienie swoich dzieci zgodnie z następującym rozkładem:

Poniedziałek, 23 sierpnia		Wtorek, 24 sierpnia	
Rok urodzenia 2006:		Rok urodzenia 2008:	
Godz.:	Miesiąc urodzenia:	Godz.:	Miesiąc urodzenia:
10.00	Styczen	10.00	Styczen
10.10	Luty	10.10	Luty
10.20	Marzec	10.20	Marzec
10.30	Kwiecien	10.30	Kwiecien
10.40	Maj	10.40	Maj
10.50	Czerwiec	10.50	Czerwiec
11.00	Lipiec	11.00	Lipiec
11.10	Sierpień	11.10	Sierpień
11.20	Wrzesień	11.20	Wrzesień
11.30	Pazdziernik	11.30	Pazdziernik
11.40	Listopad	11.40	Listopad
11.50	Grudzień	11.50	Grudzień
Rok urodzenia 2007:		Rok urodzenia 2009:	
Godz.:	Miesiąc urodzenia:	Godz.:	Miesiąc urodzenia:
12.40	Styczen	12.40	Styczen
12.50	Luty	12.50	Luty
13.00	Marzec	13.00	Marzec
13.10	Kwiecien	13.10	Kwiecien
13.20	Maj	13.20	Maj
13.30	Czerwiec	13.30	Czerwiec
13.40	Lipiec	13.40	Lipiec
13.50	Sierpień	13.50	Sierpień
14.00	Wrzesień		
14.10	Pazdziernik		
14.20	Listopad		
14.30	Grudzień		

Szczepionka oferowana dzieciom jest produkowana przez firmę Pfizer/BioNTech i jest pierwszą szczepionką, którą dopuszczono do obrotu w przypadku dorosłych, a następnie dzieci w tym wieku. Dane na temat podawania wymienionej szczepionki w tej konkretnej grupie wiekowej za granicą są obszerne i [potwierdzają dużą skuteczność szczepionki](#).

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, do najczęściej występujących działań niepożądanych należą dyskomfort w miejscu podania oraz osłabienie/zmęczenie, gorączka i bóle (głowy lub mięśni i stawów) utrzymujące się do 24 godzin, a niekiedy do kilku dni po przyjęciu szczepionki. W razie wystąpienia wymienionych działań niepożądanych zaszczepionemu dziecku można podać paracetamol lub ibuprofen w dawkach określonych w ulotce dołączonej do opakowania.

Istnieją ponadto rzadko występujące działania niepożądane, takie jak obrzęk w osierdziu (twór przypominający worek otaczający serce) lub w samym mięśniu sercowym, pojawiający się w okresie od 2 do 3 tygodnia po szczepieniu, zwykle po drugiej dawce i częściej u chłopców niż u dziewcząt. Chociaż wymienione działania niepożądane mogą być niekomfortowe lub nawet budzące obawę, zwykle ustępują po podaniu przeciwbólowych leków zapobiegających stanom zapalnym; osobom, u których występują poszczepienne działania niepożądane, zaleca się odpoczynek. Jeżeli zaszczepione dziecko zgłasza ból w klatce piersiowej, odczuwa silne uderzenia serca lub wydaje się mieć duszności w czasie spoczynku, należy zwrócić się do lekarza.

Trwają badania mające na celu ustalenie, czy zmiany w cyklu menstruacyjnym — zarówno plamienie, jak i skąpe bądź obfite krwawienia — są związane z przyjęciem tej szczepionki. Niektóre dziewczęta w wieku od 12 do 15 lat już rozpoczęły miesiączkowanie, podczas gdy inne jeszcze nie. Nie wszystkie dziewczęta w tym wieku mogą zdawać sobie sprawę ze zmian, ponieważ w pierwszym roku miesiączkowania krwawienia są zwykle nieregularne. Wiele dziewcząt może wstydzić się rozmowy na ten temat i niekoniecznie powiedzieć, że zauważyła jakąś różnicę. Dlatego ważne jest, aby otrzymały informację, że rozmowa na ten temat jest rzeczą właściwą i należy im stworzyć okazję do takiej rozmowy — jeżeli nie w domu, to być może w szkole z pielęgniarką lub inną osobą z personelu ochrony zdrowia.