

Nafn og kt.	Starfsmaður	Dags:

Merkingar: \* Merkið 1=skilyrði uppfyllt; 0=skilyrði ekki uppfyllt. \*\* Merkið "X" ef byrja á meðferð

Áhættuþættir sykursýki (metið í fyrstu skoðun)		Áhættuþættir skjaldkirtilssjúkdóms (metið í fyrstu skoðun)		Þörf á fyrirbyggjandi hjartamagnyl á meðgöngu (metið í fyrstu skoðun)		
Einn eða fleiri áhættuþættir		Einn eða fleiri áhættuþættir		Einn alvarlegur áhættuþáttur		Tveir eða fleiri miðlungs áhættuþættir
BMI > 30	*	Ófrjósemi	*	Langvinnur háþrýstingur	*	BMI > 35
Aldur > 40 ár		≥ 3 sjálfkrafa fósturlát		Undirliggjandi sykursýki		Aldur > 40
Uppruni: annar en hvítur		Ættarsaga um skjaldkirtilssjúkdóm		Saga um meðgöngueitrun eða meðgönguháþrýsting		Fjölskyldusaga um meðgöngueitrun
Áður GDM		Fyrirburarfæðing		Nýrnasjúkdómur		Fyrsta þungun
Ættarsaga 1° ættingjar		Sjálfsofnæmissjúkdómar (sjá mola)		Sjálfsofnæmissjúkdómur, s.s. rauðir úlfar (SLE) og antifosfólípíðheilkenni		Fjölburameðganga
Fyrra barn > 4500g		Stækkaður skjaldkirtill				> 10 ár frá síðustu meðgöngu
Fyrri saga um skert sykurþol		Þekktur skjaldkirtilssjúkdómur eða fyrri saga um skjaldkirtilssjúkdóm				Hvítsloppaháþrýstingur
		Joðskortur				
Mæla fastandi blóðsykur. Sjá skema fyrir meðgöngusykursýki	**	Mæla TSH Um meðferð og eftirlit sjá mola	**	ASA 150 mg x1 á dag frá 12 vikum	**	ASA 150 mg x1 á dag frá 12 vikum
Ekkert af ofanskráðu á við	*	Ekkert af ofanskráðu á við	*	Ekkert af ofanskráðu á við	*	Ekkert af ofanskráðu á við

Þörf á fyrirbyggjandi blóðsegameðferð á meðgöngu (metið í fyrstu skoðun og endurtekið við innlögn eða ný vandamál)						
Ábending fyrir segavörn		Bjóða segavörn ef einn eða fleiri áhættuþættir			Bjóða segavörn alla meðgönguna ef ≥4 áhættuþættir en frá 28 vikum ef 3 áhættuþættir.	
Saga um bláæðasega, undantekning er stakt tilvik í tengslum við skurðaðgerð	*	Fengið blóðsega einu sinni í tengslum við skurðaðgerð	*	Aldur > 35 ár	*	
		Segamyndunarhneigð en ekki fengið bláæðasega		BMI > 30		
		Innlögn á sjúkrahús		Fjöldi fæðinga ≥ 3		
		Skurðaðgerðir s.s. botnlanganám		Reykingar		
		Sjúkdómar s.s. hjartabilun rauðir úlfar eða aðrir bólgsjúkdómar krabbamein nýrnasjúkdómar sigðkornablóleysi sprautufíkn		Saga um tilefnislusaðan/estrogen tengdan blóðsega hjá 1° ættingja		
				Langt ferðalag > 4 tímarr		
				Meðgöngueitrun		
				Ofþornun / mikil uppköst		
				Fjölburaþungun		
				Tæknifrifjóvgun		
				Langvinnt hreyfingarleysi t.d. tengt lömun eða slæmri grindargliðun		
Mikil áhætta Þörf á fyrirbyggjandi heparímeðferð Tilvísun til sérfræðings	**	Miðlungs áhætta Hugið að fyrirbyggjandi meðferð með heparíni. Leitið ráða hjá sérfræðingi (blóðmeinafræðingi með sérþekkingu á segahneigð)	**	Miðlungs áhætta Hugið að fyrirbyggjandi meðferð með heparíni. Leitið ráða hjá sérfræðingi (blóðmeinafræðingi með sérþekkingu á segahneigð)	**	
Ekkert af ofanskráðu á við	*	Ekkert af ofanskráðu á við	*	Ekkert af ofanskráðu á við	*	
					Ef áhættuþættir eru færri en 3 er lítil áhætta. Hvetja skal til hreyfingar og forðast ofþornun.	